

คำแนะนำเมื่อถูกกัด-ข่วน-เลีย



ล้างแผล

ด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง



ใส่ยา

เบตาดีน



กักหมา-แมว

เพื่อสังเกตอาการ 10 วัน



หาหมอ

หากฉีควัคซีนต้องมาตามนัดทุกครั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง



ฉีควัคซีน

โรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



เลี้ยงในรั้วบ้าน

ออกนอกบ้านต้อง **ใส่สายจูง**



ฝึกให้ เชื้อฟังคำสั่ง



ทำหมัน คู่หมั้น

ติดต่อขอรับแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว

- 📌 อสม. ที่รับผิดชอบครัวเรือนของท่าน
- 📌 ศูนย์บริการร่วม One Stop Service
- 📌 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหรือลงทะเบียนออนไลน์



หยุดเสียงด้วยคาตา 5ย.
ป้องกันพิษสุนัขบ้า

- อย่าแหย่** ให้สุนัขโมโห 
- อย่าเหยียบ** สุนัขให้ตกใจ 
- อย่าแหยก** สัตว์ที่กัดกันด้วยมือเปล่า 
- อย่าหยิบ** แยมจานอาหาร 
- อย่ายุ่ง** สุนัขที่ไม่ได้เลี้ยง 



< Scan ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง(มีเจ้าของ)



ลงทะเบียน ONLINE

สแกน QR Code
บันทึกข้อมูล
รายละเอียด



ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้

สอบถามรายละเอียด

โทร. 0-5524-4544 ต่อ 115

มือถือ : 09-1843-2417



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าคุณเอนก เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี



โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าคุณเอนก
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เพื่อประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า

ภายในปี 2563



ด้วยความปรารถนาดีจาก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลบ้านคลอง จังหวัดพิษณุโลก

โรคพิษสุนัขบ้า

เชื่อก่อนโรคและสาเหตุ

เกิดจากเชื้อไวรัส Rabies ที่มีอยู่ในน้ำลายของสัตว์ ส่วนใหญ่พบในสุนัขและแมว

ระยะเวลาของอาการ

ใช้เวลาประมาณ 2-8 สัปดาห์ แต่อาจสั้นกว่าเพียงแค่ 7 วัน แต่ส่วนใหญ่ไม่เกิน 1 ปี

ไม่ควรเล่นหรือเข้าใกล้สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่รู้จัก

“โรคพิษสุนัขบ้า
ติดเชื้อถึงตาย
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน”

ดูอย่างไรว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะเริ่มแรก

- บิสัยเปลี่ยน ไม่ร่าเริง
- ทบุดทิด เก็บตัว
- ทวาดระแวง บานตาขยาย

ระยะตื่นเต้น

- กระวนกระวาย
- กัดไม่เลือก
- ทำทอน

ระยะอัมพาต

- น้ำลายไหล
- คางห้อยตก
- ล้มลง ตาย



กลุ่มเสี่ยง

- 1 เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
- 2 ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงและจำหน่ายสัตว์
- 3 ผู้ที่ถูกสัตว์กัดแล้วไม่ไปฉีดวัคซีน

การติดต่อ

ถูกสัตว์ที่มีเชื้อ

กัด

ข่วน

เลีย

“ไม่ติดจากคนสู่คน”

อาการของโรค



เป็นไข้ หนาวสั่น



กลืนไม่ได้/กลืนลำบาก



หายใจลำบาก



กลัมน้ำ/กลัวม



ชัก หมดสติ และเป็นอัมพาต



ซึ่งผู้ป่วยเกือบทั้งหมดที่ติดเชื้อไวรัสนี้จะเสียชีวิต เนื่องจากส่วนที่สำคัญของสมองถูกทำลายไปหมด



“รัก-เลี้ยง-รับผิดชอบ” คือคำตอบสุดท้าย

ร่วมด้วยช่วยกัน ๐ ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง

๐ ไม่ปล่อยทิ้งเป็นสุนัขจรจัด ๐ ผ่าตัดทำหมัน

๐ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่ออายุ 2-3 เดือนขึ้นไป

๐ และฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี เพื่อห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า

เจ้าของสุนัขและแมวต้องรู้

1. เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องขึ้นทะเบียนกับเทศบาล
2. เจ้าของสัตว์(สุนัข/แมว) ต้องพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือน หลังจากนั้น 1 เดือน กระตุ้นซ้ำอีก 1 ครั้ง จากนั้นฉีดกระตุ้นตามกำหนดทุกปี
3. ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพัง
4. ควบคุมจำนวนสัตว์เลี้ยงโดยการทำหมันถาวร
5. ป้องกันตัวเองจากการถูกสัตว์กัดหรือข่วน

“รักและใส่ใจ

ไม่ทอดทิ้งเป็นการสังคมน”



คุณจร(จัด)ตำแหน่งที่ไม่ต้องการ

ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ทั่วโลก เกิดขึ้นจากสุนัขและแมวจรจัดที่ไม่สามารถให้วัคซีนได้